

Brève communication

Introduction à l'inventaire des Odonates des environs de Barbezieux (département de la Charente)

par Hubert SCHMITT

La ville de Barbezieux est située au sud du département de la Charente à 33 km au sud d'Angoulême.

Les sites prospectés sont tous localisés sur la commune de Barret qui est située à 4 km de Barbezieux. Il s'agit essentiellement de petits étangs et de mares ; aucun cours d'eau n'a été prospecté.

Les étangs sont creusés dans un sol calcaire et la végétation qui les entoure est moyennement fournie. Les bois situés à proximité de ces plans d'eau constituent aussi des zones intéressantes à prospecter du fait des comportements terrestres des Odonates.

Les inspections se sont étalées sur deux années.

Les espèces recensées à ce jour sont les suivantes :

Calopteryx splendens (Harris, 1782)
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Coenagrion puella (L., 1758)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Aeshna cyanea (Müller, 1764)
Anax imperator Leach, 1815
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Libellula depressa L., 1758
Libellula quadrimaculata L., 1758
Orthetrum cancellatum (L., 1758)
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)

Au mois de juillet 1990, j'ai observé la présence de plusieurs individus de *Calopteryx haemorrhoidalis* (Vander Linden 1825) à proximité d'un étang.

S'agissait-il d'exemplaires remontés du sud poussés par la sécheresse et la chaleur ou plus simplement d'individus autochtones qui se sont écartés des cours d'eau proches du lieu d'observation ?