

Les descriptions originales des Odonates d'Europe

9. Latreille, Pierre-André (1762 - 1833)

par Jacques d'AGUILAR
7, rue Adrien Lejeune, F-93170 Bagnolet

Mots-clés : ODONATES, SYSTEMATIQUE, DESCRIPTION, LATREILLE.

Key-words : ODONATA, SYSTEMATICS, LATREILLE.

Résumé : Ce neuvième article est consacré à Pierre-André Latreille (1762-1833) qui apporta une contribution importante à l'entomologie. Deux travaux concernent les Odonates avec la description d'*Aeshna mixta* et la désignation de *virgo* comme espèce-type du genre *Agrion*.

Summary : The original descriptions of European Odonata. 9. Latreille, Pierre-André (1762-1833).

This 8th article is devoted to Pierre-André Latreille whose contribution to entomology is important. Two of his works are related to Odonata and include the description of *Aeshna mixta* and the designation of *virgo* as the type-species of *Agrion* genus.

La contribution capitale de P-A Latreille à l'entomologie le fit consacrer « princeps Entomologiae » par Fabricius, « prince de l'entomologie ». Professeur au Muséum, titulaire de la première chaire d'entomologie créée au monde, membre de l'Institut et président d'honneur de la Société entomologique de France dès sa fondation en 1832, on lui connaît de nombreux travaux dont une douzaine d'ouvrages fondamentaux.

Parmi ceux-ci, deux présentent un intérêt particulier pour les odonatologistes :

- *Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes* dans le « Buffon de Sonini », où Latreille décrit une espèce nouvelle, *Aeshna mixta*, aux pages 7 et 8 du tome XIII publié à Paris en 1805 (an XIII).

- *Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux*, paru à Paris en 1810, à la fin duquel Latreille présente un tableau des genres avec l'indication de l'espèce qui leur sert de type où il désigne *virgo* comme type du genre *Agrion*. On sait que cette opinion n'a pas été suivie sur le plan de la nomenclature (voir Les espèces et les genre de Fabricius in *Martinia* T. 15 (2), 1999 p. 56).

Nous reproduisons la page de titre du volume XIII de « l'Histoire naturelle... », et les pages 7 et 8 ainsi que la page de titre des « Considérations générales... » et les pages 421 et 434.

HISTOIRE NATURELLE,
GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE,
DES CRUSTACÉS
ET DES INSECTES.

OUVRAGE faisant suite aux Œuvres de **LECLERC DE BUFFON**, et partie du Cours complet d'Histoire naturelle rédigé par **C. S. SONNINI**, membre de plusieurs Sociétés savantes.

PAR **P. A. LATREILLE**,

Membre associé de l'Institut national de France, des Sociétés Linnéenne de Londres, Philomathique, Histoire naturelle de Paris, et de celle des Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux.

TOME TREIZIÈME.



A PARIS,
 DE L'IMPRIMERIE DE **F. DUFART**.
 AN XIII.

DES LIBELLULINES: 7

2. *Æ. GRANDE*; *æshna grandis*. Fab.

La julie. Geoff. *demoiselle*. — Schæff. Icon. tab. 2, fig. 4; et tab. 60, fig. 1. — Roes. Ins. tom. II, aquat. class. 2, tab. 4. — Harris, Ins. Angl. tab. 12.

D'un brun fauve; devant de la tête jaune, sans taches; ailes roussâtres; deux lignes jaunes de chaque côté du corselet; côtés de l'abdomen tachetés de verd ou de jaunâtre. — En Europe.

3. *Æ. TRÈS-TACHETÉE*; *æshna maculatissima*.

Libellula juncea? Lin. — Harr. Ins. Angl. tab. 23, fig. 4. — Roes. ins. tom. II, aquat. class. 2, tab. 2. — Réaum. Mém. insect. tom. VI, pl. xxxv, fig. 5. — Schæff. Icon. ins. tab. 6, fig. 5, 10.

Brune ou rougeâtre; devant de la tête jaune, avec le haut noir; trois bandes de chaque côté du corselet, et une ligne entre la seconde et la troisième, d'un jaune verdâtre; ailes ayant une foible teinte jaunâtre; abdomen très-tacheté; deux taches d'un verd bleuâtre accolées, sur le bord postérieur de chaque anneau, en dessus. — Aux environs de Paris, en Allemagne, en Angleterre.

4. *Æ. MÉLANGÉE*; *æshna mixta*.

Harris, Ins. Angl. tab. 27, fig. 1.

Devant de la tête jaune, avec une tache noire sur le haut; corselet verdâtre brun,

8 HISTOIRE

avec deux petites taches en devant, et deux bandes de chaque côté d'un jaune verdâtre; abdomen ayant un grand nombre de taches diverses brunes, mêlées de taches jaunâtres et coupées par du noir; ailes sans teintes. — Aux environs de Paris, en Angleterre; elle m'a été donnée par M. de Sèves, peintre, et dont les talens concourent à l'exécution de cette édition de Buffon.

5. *Æ.* A TENAILLES; *æshna forcipata*. Fab.

La caroline. Geoff. — Réaum. Mém. ins. tom. VI, pl. xxxv, fig. 5. — Roes. Insect. tom. II, aquat. class. 2, tab. 5, fig. 5, 4. — Panz. Faun. insect. germ. fasc. 88, tab. 21.

Devant de la tête jaune, avec des lignes transverses noires; corselet presque entièrement jaune-vert, avec six lignes noires, rapprochées par paire; une au milieu en devant, et les deux autres scapulaires; abdomen noir; une tache jaune-vert interrompue le long du dos; taches marginales des ailes d'un brun clair; base des ailes un peu jaunâtre dans quelques-unes. — Commune en Europe.

La cécile de Geoffroy ne diffère, suivant lui, de la précédente que parce que son corselet et le premier anneau du ventre sont d'un verd jaunâtre, sans mélange d'aucune autre couleur. Les pattes sont brunes, et

CONSIDÉRATIONS

GÉNÉRALES

SUR L'ORDRE NATUREL

DES ANIMAUX

COMPOSANT LES CLASSES

DES CRUSTACÉS, DES ARACHNIDES,
ET DES INSECTES;

AVEC

UN TABLEAU MÉTHODIQUE DE LEURS GENRES,
DISPOSÉS EN FAMILLES.

PAR P. A. LATREILLE,

Correspondant de l'Institut de France, de l'Académie royale
des Sciences de Bavière, des Sociétés Philomatique et
Linnéenne, de celles d'Histoire naturelle de Berlin, de
Mostou, de Wetteravie, de la Société médicale d'Emulation
de Bordeaux, de celles des Sciences et Arts de la même
ville, de Lille, de Nantes, etc.

PARIS,

CHEZ F. SCHOELL, rue des Fossés S. G. l'Auxerrois, n. 29.

1810.

TABLE DES GENRES

AVEC L'INDICATION DE L'ESPÈCE

QUI LEUR SERT DE TYPE ¹.

CLASSE DES CRUSTACÉS. *CRUSTACEA*.

ORDRE I. ENTOMOSTRACÉS. *Entomostraca*.

FAMILLE I. CLYPÉACÉS.

Limule. *Limulus polyphemus*, Fab.
 Apus. *Monoculus apus*, Fab.
 Calige. *Monoculus piscinus*, Fab.
 Binocle. *Monoculus argulus*, Fab.

Cypris. *Monoculus conchaceus*, Fab.
 Cythérée. *Monoculus viridis*, Fab.

FAMILLE III. GYMNOTES.

FAMILLE II. OSTRACODES.

Lyncé. *Monoculus brachyurus*, Fab.
 Daphnie. *Monoculus pulex*, Fab.

Clyclope. *Monoculus quadricornis*, Fab.
 Polyphème. *Monoculus pediculus*, Fab.
 Zoë. *Zoe pelagica*, Bosc.
 Branchiopode. *Branchiopoda stagnalis*, Lam. ; *gammaurus stagnalis*, Fab.

¹ On sera sans doute frappé de cette discordance que présentent ma nomenclature générique et celle de Fabricius ; mais si l'on suit les progrès de la science, on jugera sans peine qu'il est l'auteur de ce bouleversement. Je n'ai pas cru que sa réputation dût prévaloir sur les bonnes règles établies par lui-même. J'ai marqué d'un astérisque les genres qui me sont propres, du moins quant aux dénominations, en remontant à l'époque (1796) où je publiai mon *Précis des caractères génériques des insectes*.

(434)

- 219.* Hydromètre. *Hydrometra stagnorum*, Fab.
 220.* Vêlic. *Hydrometra rivulorum*, Fab.
 221. Gerris. *Hydrometra lacustis*, Fab.
 222. Acanthie. *Lygæus saltatorius*, Fab.
 223.* Leptopé. *Leptopus littoralis*, Lat.
 FAMILLE III. PUNAISES D'EAU.²¹⁶
 224.* Pélogone. *Pelagonus marginatus*, Lat.
 * Galgule. *Naucoris oculata*, 225. Fab.
 * Bélostome. *Nepa grandis*, 226. Fab.
 Naucore. *Naucoris cimicoides*, Fab.
 Népe. *Nepa cinerea*, Fab. 227.
 Ranatre. *Ranatra linearis*, 228. Fab.
 Notonecte. *Notonecta glauca*, 229. Fab.
 Corise. *Sigara striata*, Fab. 230.

SECTION II. HOMOPTÈRES. Homoptera.

- FAMILLE IV. CICADAÏRES. Tettigone. Les genres : *cicada* et *iassus* de Fabricius.
 Cigale. *Tettigonia plebeia*, Fab.
 Fulgore. *Fulgora europæa*, Fab.
 * Tétigomètre. *Fulgora virescens*, Panz.
 * Aïraque. *Delphax clavicornis*, Fab.
 Delphax. *Delphax striata*, Fab.
 * Étalion. *Lystra reticulata*, Fab.
 Cercope. *Cercopis sanguinolenta*, Fab.
 Lèdre. *Ledra aurita*, Fab.
 Membrace. Les genres : *membracis*, *darnis* et *centrotus* de Fabricius.
 FAMILLES V. PSYLLIDES. Psylle. *Chermes alni*, Fab.
 * Livie: *Livia juncorum*, Lat.
 FAMILLE VI. APHIDIENS. Thrips. *Thrips physapus*, Fab.
 Puceron. *Aphis millefolii*, Fab.
 * Aleyrode. *Tinea proletella*, Liu.
 FAMILLE VII. GALLINSECTES. Dorthésie. *Coccus characias*, Fab.
 Cochenille. *Coccus persicæ*, Fab. ; ejusd. *C. ulmi*.

ORDRE IV. NÉVROPTÈRES. Neuroptera.

SECTION I. SUBULICORNES. Subulicornes.

- FAMILLE I. LIBELLULINES. Agrion. *Agrion virgo*, Fab.
 Libellule. *Libellula 4-maculata*, Fab.
 Eschne. *Æschna forcipata*, Fab.
 FAMILLE II. EPHÉMÉRINES. Ephémère. *Ephemera vulgata*, Fab.