

Les descriptions originales des Odonates d'Europe

3. Fourcroy, Antoine François de (1755-1809)

Par Jacques d'AGUILAR
7, rue Adrien Lejeune, F-93170 Bagnolet

Mots clés : ODONATES, SYSTEMATIQUE, DESCRIPTION, FOURCROY

Résumé : Ce troisième article est consacré à Antoine François de Fourcroy (1755-1809) et à l'histoire de la description d'*Ophiogomphus cecilia*.

Summary : The original descriptions of European Odonata. 3. Fourcroy, Antoine François de (1755-1809). This third article is devoted to Antoine François de Fourcroy and to the history of the description of *Ophiogomphus cecilia*

Ce médecin a publié à Paris en 1785 un ouvrage **Entomologia parisiensis...** qui est un résumé de l'œuvre de E. L. Geoffroy : **Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris, dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique**, publié à Paris en 1762 et réimprimé en 1764.

En réalité Fourcroy a repris les noms vernaculaires de Geoffroy en ajoutant un binôme linnéen tout en conservant les diagnoses latines. De plus, en accord avec Geoffroy, il ajoute 256 espèces nouvelles. Ces additions seront d'ailleurs reprises comme supplément par Geoffroy dans la deuxième édition (1799 et 1800) de son **Histoire abrégée des insectes**.

Sur le plan de la nomenclature un problème s'est posé quant à la paternité des noms proposés par Fourcroy¹. Suivant l'article 51 du Code international de nomenclature Zoologique, il est recommandé de citer notre espèce de la façon suivante :

Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Nous reproduisons la page de titre de la 2^e partie d'**Entomologia parisiensis** et la page 348 ainsi que la page de titre du second tome de la première édition de l'ouvrage de Geoffroy et la page 229 où se trouvent les descriptions de *L. cecilia*.

¹ J. d'AGUILAR et F. RAIMBAULT, 1990, L'Entomologiste, 46 (1) : 37-40.

**ENTOMOLOGIA
PARISIENSIS;**

S I V E

CATALOGUS Insectorum quæ in Agro
Parisiensi reperiuntur;

SECUNDUM methodum *Geoffræanam* in
sectiones, genera & species distributus:

CUI addita sunt nomina trivialia & fere trecentæ novæ
Species.

*Edente A. F. DE FOURCROY, Doct.
Med. Paris.; è Reg. Scientiar. Academ.;
è Reg. Soc. Medic. &c.*

PARS SECUNDA.



PARISIIS,

VIA ET ÆDIBUS SERPENTINEIS.



M. DCC. LXXXV.

SUB PRIVILEGIO ACADEMIÆ.

348 ENTOMOLOGIA

L. thorace luteo virescente lineis nigris,
abdomine nigricante caracteribus flavis.

Loc. Habitat amniun ripas.

15. L. cecilia.

La Cécile.

L. thorace virescente abdomine fusco
caracteribus flavis.

Loc. Idem.

16. L. victoria.

La Victoire.

Long. 15 lig.

L. corpore flavo, abdomine cylindrico,
alarum basi flavicante.

Loc. Idem.

LXXVI. PERLA. *LA PERLE.*

Antennæ filiformes.

Alæ incumbentes, cruciatae aequales.

Os tentaculis quatuor.

Cauda bifida.

Ocelli tres.

HISTOIRE

A B R É G É E

DES INSECTES,

*Dans laquelle ces Animaux sont rangés suivant un
ordre méthodique ;*

Par M. GEOFFROY, Docteur en Médecine.

Admiranda tibi levium spectacula rerum. Virg. Georg. iv.

TOME SECOND.



A P A R I S,

Chez DURAND, neveu, rue S. Jacques, à la Sagesse.

M. DCC. LXIV.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.

DES INSECTES.

229

noire du bord extérieur. On trouve cette espèce avec les autres dans les prés & les endroits aquatiques.

14. *LIBELLULA thorace virescente, abdomine fusco, characteribus flavis.*

La cecile.

Celle-ci plus grande que la précédente, pourroit bien n'en être qu'une variété. Elle a comme elle la tête jaune & de gros yeux bruns, le ventre brun avec des taches jaunâtres sur les côtés, ainsi que vers le bas & le haut de chaque anneau. La seule différence consiste dans le corcelet & le premier anneau du ventre qui sont d'un vert jaunâtre sans mélange d'aucune autre couleur. Les pattes sont brunes & les ailes quelquefois un peu colorées de jaune, avec la tache oblongue du bord un peu cendrée.

P E R L A.

L A P E R L E.

Antennæ filiformes.

Antennes filiformes.

Alæ incumbentes, cruciatae, æquales.

Ailes égales, couchées & croisées sur le corps.

Os tentaculis quatuor.

Bouche accompagnée de quatre barbillons

Cauda bifida.

Queue terminée par deux foies.

Ocelli tres.

Trois petits yeux lisses.

Plusieurs Naturalistes ont confondu ensemble la perle & la frigane, qui réellement approchent beaucoup l'une de l'autre; toutes deux ont leurs antennes longues & minces comme un fil; toutes deux ont quatre barbillons à la bouche & trois petits yeux lisses sur la tête; enfin la frigane & la perle viennent de larves aquatiques qui se ressemblent beaucoup. Mais il y a deux caractères qui distinguent ces insectes. D'abord la perle porte à sa queue deux longues appendices fort minces, comme des espèces de soie, & qui ne se trouvent point dans la frigane; de plus les ailes