

Brève communication

***Hemianax ephippiger* (Burmeister, 1839)
dans le val de Loire bourguignon (Saône-et-Loire)
(Odonata, Anisoptera, Aeshnidae).**

Le 9 juillet 1995, je prospecte l'ancien cours de la Loire à Saint-Martin-du-Lac (Saône-et-Loire). Je note tout de suite un grand Anisoptère qui chasse en permanence au-dessus des bancs de boue qui longent le recul. Son vol plutôt hésitant est très particulier puisque cette libellule chasse en permanence à une trentaine de centimètres du sol, saisissant de temps à autre une proie au sol et ce sans jamais se poser. Sa couleur générale brun roux et la tache bleue sur la partie supérieure du deuxième segment abdominal me font reconnaître sans aucune hésitation un ♂ d'*Hemianax ephippiger* (Burmeister, 1839). La visite du reste du recul me permet de découvrir au moins deux autres individus de la même espèce. Tous ont le même comportement de chasse et défendent vigoureusement leur territoire contre ceux de leur propre espèce ou tout autre Anisoptère.

Le 23 juillet, je suis de nouveau sur place et cette fois observe quatre ♂ d'*Hemianax* chassant aux mêmes endroits. Enfin, le 20 août, il n'y avait plus trace de ces insectes.

Lors de mes différentes visites sur ce site ainsi que sur la Loire toute proche que je prospecte depuis presque vingt ans, j'ai noté également : *Calopteryx splendens* (Harris, 1782), *Chacolestes viridis* (Vander Linden, 1825), *Platycnemis pennipes* (Pallas, 1771), *Cercion lindenii* (Sélys, 1840), *Ceriagrion tenellum* (de Villers, 1789), *Coenagrion puella* (L., 1758), *Enallagma cyathigerum* (Charpentier, 1840), *Erythromma viridulum* (Charpentier, 1840), *Ischnura elegans* (Vander Linden, 1820), *I. pumilio* (Charpentier, 1825), *Pyrrhosoma nymphula* (Sulzer, 1776), *Aeshna affinis* Vander Linden, 1823, *A. cyanea* (Müller, 1764), *A. mixta* Latreille, 1805, *Anax imperator* Leach, 1815, *Boyeria irene* (Fonscolombe, 1838), *G. pulchellus* Sélys, 1840, *G. simillimus* Sélys, 1840, *Gomphus vulgatissimus* (L., 1758), *Onychogomphus forcipatus* (L., 1758), *Ophiogomphus cecilia* (Fourcroy, 1785), *Crocothemis erythraea* (Brullé, 1832), *Libellula depressa* L., 1758, *L. fulva* Müller, 1764, *Orthetrum albistylum* (Sélys, 1848), *O. brunneum* (Fonscolombe, 1837), *O. cancellatum* (L., 1758), *O. coerulescens* (Fabricius, 1798), *Sympetrum fonscolombii* (Sélys, 1840), *S. meridionale* (Sélys, 1841), *S. sanguineum* (Müller, 1764), *S. striolatum* (Charpentier, 1840), *S. vulgatum* (L., 1758).

Hemianax ephippiger est une espèce africaine sujette à invasions dans toute l'Europe. L'espèce est connue pour se reproduire en Camargue. Plus près de chez nous cette libellule a été notée dans le Rhône (GRAND, 1990, *Martinia*, 6 (4) : 85-92) et la Nièvre (ORIEUX, 1990, *Martinia*, 6 (2) : 34). Enfin, récemment OERTLI (1995, *Martinia*, 11 (2) : 35-42) suppose avoir découvert de nombreuses exuvies de cette espèce dans le val de Saône en Saône-et-Loire.

Dominique Brugière
39, rue Sidi-Brahim, F-03200 Vichy