
Brève communication

Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) dans le moyen val d'Allier (Allier)

par Dominique Brugière

Le 11 août 1991, je récoltai sur les bords de la rivière Allier, entre Billy et Moulins (03), 75 exuvies de Gomphidae.

Deux spécimens appartiennent à l'espèce *Stylurus flavipes* (Charpentier, 1825). La station de récolte est un enrochement au niveau de la commune de Paray-sous-Briailles, tout près de Vichy. Cette espèce est nouvelle pour l'Auvergne mais elle a été récemment citée de la Nièvre (ORIEUX & LALEURE, 1990). Il sera utile de poursuivre les recherches plus en amont (Puy-de-Dôme) afin de préciser l'aire de distribution de ce Gomphidae.

Parmi les autres exuvies, nous avons déterminé *Gomphus vulgatissimus* (L., 1758), *G. simillimus* (Sélys, 1840), *G. pulchellus* (Sélys, 1840), *Onychogomphus forcipatus forcipatus* (L., 1758) et *Ophiogomphus cecilia* (Fourcroy, 1785). Ces 5 espèces sont connues de la région (BRUGIERE, 1986; FRANCEZ, 1985).

Travaux cités :

- BRUGIERE (D.), 1986. - Recherches sur les Odonates de l'Allier. - *Rev. sci. Bourbonnais*, x : 32-41
- FRANCEZ (A.-J.), 1985. - Les Odonates d'Auvergne : répartition de quelques espèces rares ou peu connues. Essai de zoogéographie régionale. - *Entomologiste*, 41 : 101-111.
- ORIEUX (G.) et LALLEURE (J.-C.), 1990. - Gomphidae observés sur la Loire et l'Allier dans le département de la Nièvre. - *Martinia*, n°6 : 93-97.

5, rue des Anémones, F-03200 Vichy
