

## Présence de *Gomphus graslinii* (Rambur, 1842) dans le département de la Sarthe

par Séverine HUBERT  
8 ter, rue de Monaco, F-72000 Le Mans

**Mots clés :** ODONATA, GOMPHIDAE, FAUNISTIQUE, 72

**Key-words :** ODONATA, SARTHE DEPARTMENT, FRANCE

**Résumé :** Au cours de la saison 1998, un individu de *Gomphus graslinii* (Rambur, 1842), fut trouvé dans le département de la Sarthe, département où il n'avait pas été signalé depuis 35 ans.

**Summary :** *Gomphus graslinii* (Rambur, 1842) in Sarthe department. In 1998, a specimen of *Gomphus graslinii* was found in the Sarthe department, where it had not been noticed since 35 years.

---

C'est au cours de mes activités professionnelles au sein du Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois (encadrement d'un groupe de six stagiaires en formation post B.T.S. Gestion et Protection de la Nature) et au cours de prospections odonatologiques dans le but d'établir ultérieurement un atlas de répartition communale des Odonates de la Sarthe que je me suis rendue en compagnie de ces stagiaires, en vallée du Loir, durant le mois de juin 1998.

Ce jour là, le temps était particulièrement ensoleillé et le vent très faible : les conditions semblaient donc idéales à nos investigations.

Sur la commune de Luché-Pringé, aux alentours du Port d'Aubigné et à environ 150 mètres du Loir, nous avons capturé un *Gomphus* qui m'a tout de suite semblé curieux. C'est par une fine observation et avec une certaine incrédulité que j'ai pu affirmer qu'il s'agissait d'un individu ♂ adulte de *Gomphus graslinii*, Rambur 1842 qui venait probablement du Loir.

Cette espèce, protégée sur le plan national, inscrite à l'annexe II et IV de la Directive communautaire « Habitats, faune, flore », à l'annexe II de la convention de Berne, et considérée comme vulnérable sur le Livre Rouge de la Faune menacée en France, n'a pas été mentionnée à ma connaissance en Sarthe depuis 1963 (THIBAUT, 1966, qui le cite à Cré-sur-Loir). C'est pourtant dans ce département qu'elle fut observée pour la première fois en France au siècle dernier, dans les environs de Château-du-Loir par A. Graslin (RAMBUR, 1842), c'est-à-dire à peine à 30 km à vol d'oiseau de Luché-Pringé. Selon les cartes de répartition nationale (DOMMANGET, 1987, 1994), il s'agirait là de sa limite nord extrême, la vallée du Loir étant déjà

connue pour constituer la limite nord absolue de répartition de plusieurs espèces (végétales notamment).

Il serait nécessaire de préciser cette observation afin de déterminer le foyer de l'espèce et une estimation de la population. La vallée du Loir mérite d'être prospectée de manière plus approfondie afin de préciser le statut de cette espèce dans le département. J'espère que les saisons à venir pourront être fructueuses en la matière !

**Travaux cités :**

DOMMANGET J.-L., 1987.- Etude faunistique et bibliographique des Odonates de France.- *Inventaire de Faune et de Flore*, 36. MNHM - SFF, 283 p.

DOMMANGET J.-L., (Coord.) 1994.- Atlas préliminaire des Odonates de France. Etat d'avancement au 31/12/93.- Coll. Patrimoines Naturels, Vol. 16. Paris, SFF/MNHN, SFO et Min Env., 92 p.

THIBAULT M., 1966.- Note sur les Odonates de l'Ouest de la France.- *Bull. Soc. ent. France*, 71 : 57-67.

RAMBUR M. P., 1842.- Odonata. In : Histoire Naturelle des Insectes. Névroptères.- Roret, Paris, : 3-291.



***Gomphus graslinii* Rambur, 1842**  
(Cliché J.-L. Dommanget)