

A PROPOS DE *CERIAGRION TENELLUM* (de VILLERS, 1789)  
OBSERVE EN CORSE (20)  
(ODONATA ZYGOPTERA : COENAGRIONIDAE)

par Michel PAPAIZIAN (1).

Certaines espèces de Zygoptères présentent des variations de couleur ou de répartition des dessins chez l'individu femelle. Ne constituant nullement des particularités géographiques, ces "formes" sont actuellement au nombre de 4 chez *Ceriagrion tenellum* (Villers, 1789), et ont pour critère, la couleur dorsale noire de l'abdomen.

- la forme *erythrogastrum* Sélys (fig. e) : homéochrome, de même coloration abdominale que le mâle (fig. f), entièrement rouge.

- la forme *intermedium* Sélys (fig. d) : hétérochrome, le quart postérieur des segments 3 à 6 est noir ainsi que la moitié distale du 7ème.

- la forme *typica* Sélys (fig. b) : hétérochrome, le quart du 3ème segment est noir, les segments 4 à 8 sont entièrement noirs, le 9ème est ponctué de noir.


- la forme *melanogastrum* Sélys (fig. a) : hétérochrome, l'abdomen est entièrement noir dorsalement.

La rencontre de *Ceriagrion tenellum* est fréquente sur les rives des fleuves à courant très lent de la plaine orientale de Corse. Le 30 juillet 1986, j'ai examiné plusieurs représentants de l'espèce sur les berges ombragées du Golo (commune de Borgo, Haute-Corse) au Sud-Est de l'aérodrome de Bastia-Poretta, dont plusieurs femelles. Elles appartenaient toutes à la forme typique sauf une. Sur celle-ci, la couleur noire ne commence qu'au quart apical du 4ème segment et se poursuit jusqu'au 8ème (fig. c); cependant, la base du 5ème segment laisse apparaître un ton rougeâtre, et l'extrémité du 3ème porte un liseré noir.

Il serait intéressant de savoir si cette forme typique "réduite" constitue une aberration, ou bien, dans l'éventualité de constats du même type, si elle est une nouvelle forme.

-----  
(1) 23 Boulevard de Roux prolongé, F-13004 MARSEILLE.

Dans ce but, je fais appel à ceux qui auraient rencontré cette coloration particulière de *Ceriagrion tenellum* femelle.



a : forme *melanogastrum*

b : forma *typica*

c : forme observée par l'auteur

d : forme *intermedium*

e : forme *erythrogastrum*

f : abdomen du mâle

### Travaux consultés:

AGUESSE (P), 1968. -- Les Odonates de l'Europe Occidentale, du Nord de l'Afrique et des Iles Atlantiques. *In* : Faune de l'Europe et du bassin méditerranéen -- Masson, Paris : 1-258.

AGUILAR (J. d'), DOMMANGET (J.-L.) & PRECHAC (R.), 1985. -- Guide des Libellules d'Europe et d'Afrique du Nord. -- Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris : 1-341.

ROBERT (P.-A.), 1958. - Les Libellules (Odonates) -- Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris : 1-364.

-----