

OBSERVATION DE QUELQUES ODONATES DANS
LES PYRENEES-ORIENTALES (66) ET L'AUDE (11)

par Christine ROCHAT (1).

Nous indiquerons ici les quelques espèces identifiées au cours d'un séjour dans les Pyrénées-Orientales en août 1986. Ces observations sont parcellaires, la plupart des lieux n'ont été visités qu'une seule fois et tous les odonates présents n'ont pas été capturés ni déterminés. Les lieux prospectés sont présentés sur la carte.

Les espèces rencontrées sont les suivantes:

Zygoptères:

Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden) (5), (6).

Calopteryx xanthostoma (Charpentier) (5).

Chalcolestes viridis (Vander Linden) (5), (9).

Lestes barbarus (Fabricius) (9).

Ischnura elegans (Vander Linden) (5).

Anisoptères:

Aeshna grandis (Linnaeus) (2).

Aeshna juncea (Linnaeus) (1).

Anax imperator Leach (7).

Cordulegaster bidentatus Selys (4).

Somatochlora metallica (Vander Linden) (2).

Orthetrum coerulescens (Fabricius) (6), (7).

Sympetrum flaveolum (Linnaeus) (3).

Sympetrum meridionale (Selys) (7), (8).

Sympetrum sanguineum (Müller) (8).

Tarnetrum fonscolombii (Selys) (5), (6), (7).

En 11 sorties durant le mois d'août, nous avons donc pu identifier 15 espèces différentes. Certaines sont fort communes comme *Ischnura elegans*, *Tarnetrum fonscolombii* ou *Anax imperator*; d'autres sont plus rares et localisées comme *Aeshna grandis*, *Somatochlora metallica*, *Sympetrum flaveolum*, ces 3 espèces ayant été rencontrées en altitude (lacs ou tourbières) ou encore *Cordulegaster bidentatus*. Cette dernière espèce ne semble pas avoir encore été citée des Pyrénées-Orientales. Nous l'avons rencontré dans son biotope

(1) 2, mail du Cèdre, F-78180 Montigny-le-Bretoneux

d'élection très particulier: un filet d'eau à flanc de montagne (1100m) sous le couvert de la végétation; l'insecte effectuait des allers et retours sur 5m environ le long du ruisseau et se posait sur les branches des arbres.

Lieux prospectés (Légende de la carte):

(1) Etangs de Camporells, altitude moyenne 2250m. Groupes de lacs de montagne de plusieurs hectares. Une tourbière séparant 2 étangs.

(2) Etang Noir, 1900m, Lac de montagne, bords encombrés d'herbes.

(3) Etang du Racou, vaste tourbière (1,5 ha), 1900m.

(4) Fontpédrouse, alt. moy. 1000m.


(5) Gué de Baho, bras du Tech, alt. 50m.

(6) Palau del Vidre, rives de la Têt, nombreux canaux et fossés d'irrigation, alt. moy. 50m.

(7) Canohès; pâturages entourés de fossés, prairie inondée, alt. 50m.

(8) Le Canet; bords de l'étang saumâtre, alt. 5m.

(9) Etang de Leucate (Nord de l'étang) Aude.



Travaux consultés:

AGUILAR (J. d'), DOMMANGET (J.-L.) & PRECHAC (R.), 1985. - Guide des Libellules d'Europe et d'Afrique du Nord. Delachaux & Niestlé, Neuchâtel, Paris : 1-341.

DOMMANGET (J.-L.), 1987. - Etude Faunistique et Bibliographique des Odonates de France In: Inventaire de Faune et de Flore, fasc. 36. Secrétariat Faune/Flore (M.N.H.N.) Paris : 1-283.